

A NEW MAPANIA (CYPERACEAE) FROM THE MALAY PENINSULA

By H. UITTEN

Mapania tumida Uitt. nov. spec.

E subgenere *Pandanoscirpi*, *Mapaniae enodi* (Miq.) Clarke proxima, sed foliis caudatis, scapis apice tumidis, primo visu diversa.

Rhizoma crassum, 1 cm. diametro. Folia coriacea glaucescentia 1.35 m. longa vel ultra, 2.5 cm. lata, tertia parte basali complicata, ceterum flaccida, margine remote et grosse dentata vel lævia, subtus præsertim basi reticulato-nodulosa et pallidiora, apice subito in caudam triquetram asperrimam contracta.

Scapi efoliati, 14–22 cm. longi, basi squamis nonnullis ovatis vel oblongis obtusis papyraceis, spatio fere 4 cm. longo, absconditi, basi 1–2 mm., apice 3 mm. crassi, læves. Spicula fructifera conica, 2 cm. longa, 1.5 cm. lata. Flores ignoti. Nuces ut in *M. enode* (Miq.) Clarke (*M. longa* Ridl.), 5 mm. longæ, depresso globosæ, manifeste apiculatæ, rugosæ, basi constrictæ et in stipitem 2–3 mm. latum, angulosum dilatatæ.

Peninsula malaica, in ditione Johore, Sungai Kayu, S. Sedili, in silva paludosa. Legit E. J. H. CORNER, d.d. 3 Aug. 1935, S. F. nr. 29736.

Typus in herbario bogoriense (Buitenzorg); Typi duplum in herb. Singapore.

BOTANICAL MUSEUM & HERBARIUM,
STATE UNIVERSITY, UTRECHT (HOLLAND).